




공간정보 기반의 농업 연구사례와 정책적 활용가치

－ 나 상 일 박사 －
(국립농업과학원 기후변화생태과)

공간정보 기반 농업연구 사례 및 정책적 활용 가치

2017. 4. 26

국립농업과학원 농업환경부

나상일, 이경도, 박찬원, 소규호, 박재문, 홍석영

목차

1 원격탐사 기반 작황분석 현황

2 농업분야 공간정보 구축 및 활용

3 작황분석 사례 : 충청남도 대상

4 토양환경 공간정보(휴토람)

5 금후계획

농촌진흥청의 임무

주요 임무

- 원격탐사 기반 농업환경 및 작황예측 체계 구축
 - 국내외 주요 작물 작황평가 및 예측기술 개발
 - RS/GIS 이용 농업환경계측 및 농업생산환경 시스템 구축

중점 연구 방향

- 원격탐사를 이용한 국내외 작황평가 및 예측기술 개발
 - ▣ 국가단위 : 주요곡물 - 국내(벼), 국외(콩, 옥수수, 밀)
 - ▣ 시군단위 : 동계작물 - 맥류(군산, 김제), 조사료(논산, 김제)
 - ▣ 주산단지 : 기간채소 - 배추, 무, 양파, 마늘, 고추
- RS/GIS 이용 농업환경 계측 기술 개발
 - ▣ 물수지, 증발산량, 토양수분 등
- 공간정보를 이용한 농업재해 평가 기술 개발
 - ▣ 풍수해, 병해충 예찰, 생육이상 판별 등
- 농림업 차세대 중형위성 탑재체 개발 추진(미래부 협업)

농업분야에서의 원격탐사

- **작황** : 농작물의 생육 상황, 수량
 - **범위** : 면적, 수량, 생산량, 생육, 품질, 토양수분, 강수 등
 - **작황을 결정하는 요인** 광합성(빛, CO₂, H₂O)
작물의 특성
- $$\text{수량} = f \left(\underbrace{\text{기후}}_{\text{온도, 강수, 일사}}, \underbrace{\text{물·토양}}_{\text{수분 등}}, \underbrace{\text{양분}}_{\text{질소 등}}, \underbrace{\text{병충해, 재해}}_{\text{등}} \right)$$
- 잠재수량 획득가능수량 실제수량

원격탐사 모형을 이용한 작황예측 장·단점


장점	단점
- 광지역성: 동시에 상대적 비교 가능 - 주기적이고 객관적 자료 수집 수단 - 접근불능 지역 정보 획득 가능	- 위성영상 취득 당시의 현황 파악이 가능하나, 원인을 직접 알 수 없음 - 날씨등의 영향으로 영상취득 적시성 취약함

⇒ 추출 가능 농업정보 : 경지/재배면적, 생육 상황, 수량, 토지이용, 증발산량, 토양수분 등

농업분야에서의 원격탐사

식생지수


- 식생 분광특성 이용 : 파장대간의 반사율을 조합하여 식생 상태를 파악



농업분야에서의 원격탐사

식생지수를 이용한 필지별 작황비교

- RGB 칼라 영상 vs 식생지수 영상




원격탐사 기반 국내외 작황분석 현황

농업 활용분야에 따라 필요한 정보의 공간·시간해상도, 모니터주기, 촬영 범위

응용 분야		탐색체	공간해상도(m)	시간해상도	모니터주기	촬영폭(km)	촬영면적(km2)	촬영범위	파장영역
작물구분	채소	무인비행체, 항공영상	< 1	1일~1주	3개월	< 0.1	< 1	포장	Narrow-visible-NIR
	목류	항공, 위성영상	10~30	1주~1개월	6개월	15~185	225~30,000	포장~마을	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR
	벼	위성영상	250	1일~1주	1년	77~1650	> 6000	마을~지역	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR, TIR
	국외곡물	위성영상	250	1일~1주	1년	1,650	2,700,000	지역	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR
바이오매스(NPP)	벼	위성영상	250	1일~1주	1년	77~1650	> 6000	마을~지역	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR, TIR
	국외곡물	위성영상	250	1일~1주	1년	1,650	2,700,000	지역	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR, TIR
생육단계, 생장모니터링	채소	무인비행체, 항공영상	< 1	1일~1주	1주	< 0.1	< 1	포장	Narrow-visible-NIR
	목류	항공, 위성영상	10~30	1주~1개월	1개월	15~185	225~30,000	포장~마을	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR
	벼	위성영상	250	1일~1주	7월	77~1650	> 6000	마을~지역	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR, TIR
	국외곡물	위성영상	250	1일~1주	7월	1,650	2,700,000	지역	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR, TIR
생육이상, 병충해(예정)	채소	무인비행체, 항공영상	< 1	1일~1주	1주	< 0.1	< 1	포장	Narrow-visible-NIR
	목류	항공, 위성영상	10~30	1주~1개월	1개월	15~185	225~30,000	포장~마을	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR
	벼	위성영상	250	1일~1주	2~3개월	77~1650	> 6000	마을~지역	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR, TIR
	국외곡물	위성영상	250	1일~1주	7월	1,650	2,700,000	지역	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR, TIR
수확 매핑	채소	무인비행체, 항공영상	< 1	1일~1주	3개월	< 0.1	< 1	포장	Narrow-visible-NIR
	목류	항공, 위성영상	10~30	1주~1개월	6개월	15~185	225~30,000	포장~마을	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR
	벼	위성영상	250	1일~1주	1년	77~1650	> 6000	마을~지역	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR, TIR
	국외곡물	위성영상	250	1일~1주	1년	1,650	2,700,000	지역	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR, TIR
지역단위 기상자료 매핑	미국	위성영상	> 1000	1일	1일	1,650	2,700,000	지역	Multi-visible-NIR, TIR 등
	중국	위성영상	> 1000	1일	1일	1,650	2,700,000	지역	Multi-visible-NIR, TIR 등
	북한	위성영상	90	1일	1일	1,650	2,700,000	마을~지역	Multi-visible-NIR, TIR 등
	남한	위성영상	30	1일	1일	1,650	2,700,000	마을~지역	Multi-visible-NIR, TIR 등
토양수분	전지구	위성영상	10000	1일	1일	1,450	전지구	지역	SAR
	남한	위성영상	30	1일	1일	1,450	225~30,000	지역	Multi-visible-NIR, TIR, SAR
토양검정자료 매핑	남한	-	1~30	-	1년	-	-	포장~마을	-
물수확지	남한	항공, 위성영상	10~30	1주~1개월	1개월(특정기간)	15~185	225~30,000	포장~마을	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR
중발산량 추정	남한	항공, 위성영상	10~30	1주~1개월	1개월	15~185	225~30,000	포장~마을	Multi-visible-NIR, Narrow-visible-NIR
수치표고모델(DEM) 작성	남한	위성, 항공영상, 무인비행체	1~30	1주~1개월	5~10년	< 15	1~225	마을~지역	Multi-visible-NIR, TIR, Panchromatic
야외 측정 센서 기반 공간변이	채소, 벼	지상 관측 센서	1~10	즉시~1일	3일(특정기간)	-	-	포장	Multi-visible-NIR, TIR, Narrow-visible-NIR, Hyperspectral 등
작물, 토양특성의 점 샘플을 공간자료로 전개	남한	현장 조사	1~30	1일~1주	3개월(특정기간)	-	-	포장~마을	Panchromatic, Multi-visible-NIR, TIR, SAR


(농촌진흥청, 2015)

원격탐사 플랫폼



원격탐사 플랫폼

촬영고도에 따른 영상 비교



원격탐사 플랫폼 및 농업 모니터링 현황

플랫폼별 특성

플랫폼	촬영면적 (ha)	공간해상도 (m)	촬영가능 주기(일)	촬영 후 영상 획득 시간(일)	제약 조건	운영방법
위성	1,000 이상	1~6	15~30	15~30	기상 상황	영상 구매
항공기	300~800	0.25~0.50	주산별 연회	10	기상, 관제 상황	영상 구매
무인기	100~300	0.03~0.10	1~7	즉시	기상 상황	기기 구매

위성·항공기·무인기 기반 농경지 및 작황 모니터링 현황

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
		<봄 가뭄> 벼는 모내기 준비						<가을 가뭄> 풍수해, 병충해 평가			
			<논벼> 논벼 관개·모내기 현황, 생육현황 분석					<논벼> 재해·병충해 피해, 수량 추정			
<월동 배추·무> 작황추정			<봄 배추·무> 재배면적, 작황추정	<고령지 배추·무> 재배면적, 정식현황	<고령지 배추·무> 생육, 이상관벌, 병충해 피해			<가을 배추·무> 재배면적, 작황추정			
			<양파·마늘> 재배현황 파악	<양파·마늘> 작황추정	<고추> 재배현황 파악						
<밀·보리·조식료> 추파 재배현황			<밀·보리·조식료> 춘파 재배현황		<밀·보리·조식료> 작황추정					<밀·보리·조식료> 재배면적, 파종 현황	

1 원격탐사 기반 작황분석 현황


2 농업분야 공간정보 구축 및 활용

3 작황분석 사례 : 충청남도 대상

4 토양환경 공간정보(휴토람)

5 금후계획

스마트 팜 맵 (Smart Farm Map)



0 5 10 20 30 40 Kilometers

논 과수
밭 시설
인삼

(농식품부, 2014)

마스크 맵 (Mask Map)

마스크 맵이란?

실제 경작이 이루어지는 지역으로 작황분석의 공간적 범위를 의미


정확한 작황분석을 위해서는

작물 재배지 이외의 토지피복 지역을 배제할 필요가 있으며,


이를 위해서 **정확한 작물 재배지의 추출 과정이 선행되어야 함**

마스크 맵 작성 과정의 변화

기존 : 토지피복도 이용



현재 : 스마트 팜맵 이용




⇒ 항공·위성영상 기반의 팜 맵을 이용하여 **최신 현장상황이 반영된 필지 경계**를 기준으로 정확한 데이터(생육, 기상, 물, 토양 등) 추출 가능

재배현황 맵 (Crop Growth Map)


재배현황 맵

- 채소 작황 진단을 위해 생산하는 정식/수확, 면적, 생육, 수량 등의 전자지도
- 농식품부, 농경연 등 제공, 수급에 선제적 대응




재배현황 맵 [Crop Growth Map]

재배현황 맵 제작과정



재배현황 맵 [Crop Growth Map]


고랭지배추 재배현황 정보 생산 프레임



정보 사용자 및 작목 담당자들의 의견 수렴을 통한 작물별 재배현황 정보 생산 프레임 구축

재배현황 맵 (Crop Growth Map)

고랭지 배추 주산단지 : 강릉 안반덕



재배현황 맵 서비스 프로토타입

농촌진흥청

재배현황 맵 검색

지역 선택

전체 안반덕 귀네미 매봉산

작물선택

배추 무 양파 마늘 고추

생육 시기 선택

전체 정식 생육 수확

지도 선택

무인기 영상 2016년 06월09일 2건

식생지수 분포 선택 2건

정식시기 분포 선택 0건

생육인자(초장) 선택 0건

생육인자(엽폭) 선택 0건

생육이상 분포 선택 0건


[안반덕]정식기-무인기

다운로드

① 지역 및 작물 선택


② 생육시기 선택

③ 지도 선택 및 다운로드



추진실적

2016년 작황정보 제공현황



구분	6월			7월			8월			9월			계
	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	
	정식기			생육기			수확기						
안반덕 (110ha)	5	2	7	-	10	2	6	6	5	5	-	3	51
매봉산 (97ha)	5	2	6	-	-	3	5	11	5	5	-	3	45
귀네미 (48ha)	4	2	5	-	3	4	5	11	5	5	-	3	47
계	14	6	18	0	13	9	16	28	15	15	0	9	143

추진실적

2016년 분석정보 제공현황

고령지 배추 주산지 재배현황 무인기 영상기반 분석 결과

(국립농업과학원 기후변화생태과, 2016. 8. 22)

□ 고령지 배추 출하 상황 및 전망 * 농경면 농업관측센터(8.18)

- 최근 고온 및 가뭄지속으로 8월 하순 출하 증가폭 크지 않을 전망
- 저지대(600~800m)¹⁾ 출하 후 고지대(1,100~1,200m)로 출하 산지 이동 중
- * 무름병, 바이러스 등으로 저지대의 경우 상품성 저하로 정상 출하 어려운 상황이었음

□ 무인기 영상기반 재배현황 분석 결과

구분	강릉 안반덕	태백 매봉산	태백 귀네미	비고
재배면적(ha)	110 ha	97 ha	48 ha	분석대상 총 면적 255 ha
수확진행도(%)	8.10 5.2% 8.17 -	8.10 10.9% 8.17 54.9 %	8.10 1.1% 8.18 13.8%	수확 추정면적 65.7ha (25.8 %)
생육이상 (ha)	8.10 13.2 ha 8.17 -	8.10 7.5 ha 8.17 4.0 ha	8.10 2.8 ha 8.18 2.4 ha	
2015년 대비 생육상황	다소 부진	다소 부진	다소 부진	

- * 고지대 주산지를 대상으로 8.10~18 취득 무인기 영상을 활용한 추정치 임
- * 강릉 왕산면 안반덕의 경우 기상영향으로 8.17일 영상 미취득
- (생육상황) 고온 및 가뭄 지속으로 생육이상 면적이 작년보다 증가
- * 정식시기가 빠른 필지의 경우 생육이상 정도 심함
- (수확현황) 주산지별 정식시기에 따라 배추 수확 진행 중
- * 매봉산(55%, 8.17일자) > 귀네미(14%, 8.18일자) > 안반덕(5.2%, 8.10일자)
- (정상생육 면적)²⁾ 향후 약 170ha(66.6%)가 정상 수확가능 면적으로 추정
- * 안반덕(91ha, 8.10일자), 매봉산(40ha, 8.17일자), 귀네미(39ha, 8.18일자)

8.10 일자 영상분석 결과

(단위 : ha)

지역	정식일자	재배면적	생육이상 추정 ³⁾	수확면적	비고
안반덕	5.31 ~ 6.09	9.1	0.9	5.7	
	6.10 ~ 6.19	17.9	3.3	-	
	6.20 ~ 6.29	82.8	9.1	-	
	소계	109.8	13.2	5.7	
매봉산	5.31 ~ 6.09	70.0	5.6	10.6	
	6.10 ~ 6.19	24.3	1.7	-	
	6.20 ~ 6.29	3.0	0.3	-	
	소계	97.3	7.5	10.6	
귀네미	5.31 ~ 6.09	1.4	0.5	-	
	6.10 ~ 6.19	23.6	1.6	0.5	
	6.20 ~ 6.29	23.1	0.7	-	
	소계	48.1	2.8	0.5	
합계		255.1	23.5	16.8	

8.17~8.18 일자 영상분석 결과

(단위 : ha)

지역	정식일자	재배면적	생육이상 추정	수확면적	비고
안반덕	5.31 ~ 6.09	9.1			
	6.10 ~ 6.19	17.9			기상영향으로 영상 취득 불가함
	6.20 ~ 6.29	82.8			* 8.10 분석지 적용
	소계	109.8			
매봉산	5.31 ~ 6.09	70.0	1.3	53.2	
	6.10 ~ 6.19	24.3	2.5	0.2	
	6.20 ~ 6.29	3.0	0.2	-	
	소계	97.3	4.0	53.4	
귀네미	5.31 ~ 6.09	1.4	-	1.4	
	6.10 ~ 6.19	23.6	1.1	5.3	
	6.20 ~ 6.29	23.1	1.3	-	
	소계	48.1	2.4	6.6	
합계		255.1	19.5	65.7	


* 촬영일시 : 매봉산(8.17), 귀네미(8.18)

3) 생육이상 면적의 경우 무름병, 바이러스 등으로 상품성 저하 및 토양유실 피해 면적 포함

대상 작물 확대

채소주산지 재배현황맵 대상 작물 확대

시기	작물	지역	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2016	고랭지배추	안반덕 외 2						←			→			
	가을배추/무	고창									←		→	
	겨울배추	진도, 해남	←	→									←	→
2017	양파/마늘	창녕, 합천, 무안/태안		←				→						
2018	고추	괴산						←			→			



배추/무

- 연구개발('14~'15)
- 맵서비스('16)
- 정식시기, 면적, 생육
생육이상, 수확

양파/마늘

- 연구개발('16~'17)
- 맵서비스('17)
- 면적, 생육, 생육이상,
수확

고추

- 연구개발('18)
- 맵서비스('18)
- 면적, 생육이상

1

원격탐사 기반 작황분석 현황

2

농업분야 공간정보 구축 및 활용

3

작황분석 사례 : 충청남도 대상

4


토양환경 공간정보(휴토람)

5

금후계획


Radarsat 이용 벼 생육 모니터링 [서산시, 벼]

■ 대상지역 및 현장 생육 조사



대상지역 및 Radarsat-2 SAR 후방산란계수 변화

y2012	5/23, 6/16, 7/4, 8/3, 8/22, 9/13
y2013	5/6, 6/6, 6/30, 7/24, 8/17




현장 생육조사 지점 (10개 필지)


(나상일 등, 2014. 한국농공학회지)

Radarsat 이용 벼 생육 모니터링 [서산시, 벼]


■ 후방산란계수를 이용한 벼 생육 추정



LAI	Satellite	RADARSAT-2	RapidEye
Range		0 ~ 20,259	0 ~ 7,594
Mean		4,698	4,747
Std. Dev.		2,982	1,227



Radarsat-2 기반 LAI 분포도




RapidEye 기반 LAI 분포도

(나상일 등, 2014. 한국농공학회지)

Radarsat 이용 벼 생육 모니터링 [서산시, 벼]

- 북한(평양) 벼 생육 모니터링 적용



(나상일 등, 2014. 한국농공학회지)

풋거름 질소량 추정 [서천군, 헤어리베치]

- 표본 시료 채취 및 분석



헤어리베치



독새풀



헤어리베치와
독새풀 혼합



벗짚 피복
(나지)

(이경도 등, 2015. 한국토양비료학회지)


꽃거름 질소량 추정 [서천군, 헤어리베치]

■ 필지별 꽃거름 작물 질소량 분포 지도 작성


RS Data using UAV




Index Map



Algorithm



Pre-Task Map



(이경도 등, 2015. 한국토양비료학회지)

꽃거름 질소량 추정 [서천군, 헤어리베치]

■ 양분관리 방안 및 비료량 추천

헤어리베치 생육수준별 양분관리 방안

(두왕/외금단지 231필지 94.6ha)

무인기 영상	필지 생육정도	헤어리베치 질소생산량	양분관리 방안 (4,000㎡ 기준)
		9kg/10a 이상 (1%) ~ 231필지 중 2필지	- 기비: 혼합유박 무사용 - 추비: 무사용이 원칙이 나 생육에 따라 기비시 용량 10-20% 사용
		4~8kg/10a (3%) ~ 231필지 중 11필지	- 기비: 혼합유박 100-500g - 추비: 비 생육상황에 따라 기비시 용량의 20-30% 사용
		1~4kg/10a (21%) ~ 231필지 중 49필지	- 기비: 혼합유박 500-600g - 추비: 비 생육상황에 따라 기비시 용량의 20-30% 사용
		1kg/10a 이하 (75%) ~ 231필지 중 189필지	- 기비: 혼합유박 600g - 추비: 비 생육상황에 따라 기비시 용량의 20-30% 사용


- 헤어리베치 질소생산량 기준일 : 5월 14일
 - * 5월 14일 이후의 생육증대에 대한 검토 필요
- 기준단지 : 서래야 친환경농업 두왕/외금단지 일원
 - * 영상자료를 참고하여 타 단지의 생육상황을 고려하여 적용
- 기비는 혼합유박(4-2-1), 추비는 NK복비 사용 기준
- ※ 매년 농작을 완료하여 유효규산의 함량이 높아 질소소비기준량 중대(11kg/10a)
- ※ 서래야 친환경 단지별로 농작업이 진행되므로 조사단지를 참고하여 타 단지에 적용할 것을 추천(총 27개 단지)



무인기 활용 작황 모니터링 [논산시, IRG]

■ 대상지역 및 자료 수집


횟수	생육조사시기(월/일)	무인비행체 촬영일시(월/일)	비고
1	2/25	3/15	샘플링 및 현장 분광반사율 측정
2	3/21	4/5	샘플링 및 현장 분광반사율 측정
3	4/11	4/20	샘플링 및 현장 분광반사율 측정
4	4/29	5/11	샘플링 및 현장 분광반사율 측정
5	5/20	5/25	수확



(나상일 등, 2016. 한국토양비료학회지)

무인기 활용 작황 모니터링 [논산시, IRG]


■ 무인기 기반 식생지수 추출 및 생육조사



(나상일 등, 2016. 한국토양비료학회지)

무인기 활용 작황 모니터링 [논산시, IRG]


■ 작황 모델링 및 분포도 작성




(나상일 등, 2016. 한국토양비료학회지)

무인기 활용 재배현황 맵 서비스 [태안군, 마늘]


■ 현장 NDVI와 무인기 NDVI 비교



창녕, 합천 양파/마늘 20개 필지 대상(n=75)



A : 필지 전체(R=0.734)




B : CropCircle 스캔 영역(R=0.677)





C : 생육조사 지점(R=0.642)

무인기 활용 재배현황 맵 서비스 (태안군, 마늘)

- 시계열 영상 수집 및 작황추정 모형 구축 중(~'17)




태안군 태안읍 인평리 일대 RGB 영상(해상도 5cm)




무인기 활용 재배현황 맵 서비스 (태안군, 마늘)

- 양파/마늘 재배현황맵 작성 (창녕군, 합천군 예시)



시군단위 작물구분도 작성

- 양파/마늘 작물구분도 작성 (창녕군, 합천군 예시)



1

원격탐사 기반 작황분석 현황

2

농업분야 공간정보 구축 및 활용

3

작황분석 사례 : 충청남도 대상

4

토양환경 공간정보(휴토람)

5

금후계획

토양조사의 역사

개략토양도: 1/250,000, 1/50,000
정밀토양도: 1/25,000
세부정밀토양도: 1/5,000



적지적작으로 과학영농 실현 기반 구축!



우리나라 논밭의 토양특성 정보와
알맞은 비료 추천량을 알아볼 수 있는 인터넷 시스템

*농촌진흥청이 60여년간 국책사업으로 조사한 토양정보 전산화
: 토양전자지도(1:5,000) 기반 토양특성 지도와 비료사용처방 정보 제공

“흙토람”의 의미 : 토양의 정보를 열람함

전국 토양정보 한곳에!

개
요

토양특성 · 농작물 재배적지 등 토양전자지도 제공

비료사용처방 프로그램 이용 작물에 따라 알맞은 비료량 추천

토양환경 공간정보 (휴토람)

휴토람 - 토양환경정보시스템 구성도

<주요 기능>

토양과 농업환경

토양과 농업환경

토양과 농업환경에 대한 설명 및 정보를 제공합니다.

토양환경지도

토양환경지도

우리나라의 토양환경에 대한 상세한 정보를 GIS지도서비스로 제공합니다.

통계자료

통계자료

토양환경, 농업환경 등 다양한 통계정보를 제공합니다.

비료사용처방

비료사용처방


자연별 토양검정 및 작물별 처방서비스를 제공합니다.



토양환경 공간정보 (휴토람)

토양환경지도 - 토양 GIS 주제도

- 내 눈, 발의 주소를 입력하고 알고 싶은 토양특성을 선택하면 전국 토양의 pH, 물빠짐, 유기물 함량 등 다양한 토양정보 열람 가능



구 분	개수	주요 내용
물리적 특성	9	토성, 물빠짐, 유효토심, 경사, 자갈함량, 토양색, 토양침식정도 등
화학적 특성	25	농경지 이용별 - pH, 유기물 함량, 유효인산, 칼륨, 유효규산 등
토지이용	6	토지이용, 토지이용추천(논, 밭, 과수원 등), 토양유형(논, 밭, 산림) 등
토양분류	5	목, 아목, 지형, 모암, 퇴적양식
토양적성등급	5	논, 밭, 과수원, 초지, 산림 토양
계	50	

토양환경지도 - 토양 GIS 주제도

- 메인화면

토양 환경지도

작물별 토양적성도

농경지 화학성

토양특성

친환경 농업

토양환경지도

토양 및 농업환경 특성에 대해서 GIS 지도서비스를 제공합니다

HOME > 토양환경지도 > 토양 특성

지역

광역시/도

시/군/구

읍/면/동

리

형태적 물리적 특성

표토의 지갈함량

경사

심토의 토성

토양모재

표토의 토성

심토의 석회함량

유효토성

표토의 침식정도

심토의 주토색

배수등급

토양지형

분포지형

화적양식

토양분류

형태적분류-목

형태적분류-아목

토양유형

토지유형-논

토지유형-밭

토지유형-임지

토지이용

조사시 토지이용 (95~99)

주된 토지이용

토지이용추천

토양적성등급

논

밭

과수/상견

초지

임지

▶ 첨단 GIS 기법을 이용하여 토양의 형태적 물리적 화학적 특성을 제공하는 토양전자지도

농사를 짓고자 할때 내 논 · 밭의 토양 특성을 파악
경험영농에서 과학영농 기반 구축

▶ 구축현황


- 구축기간 : 1998~2006

- 구축범위 : 전국, 25 종

- 축척 : 1:5,000

토양환경지도 - 토양 GIS 주제도

- 물빠짐정도



형태적·물리적 특성-배수등급 지도

형태적 · 물리적 특성 - Windows Internet Explorer

http://soil.rda.go.kr/soil/soilmap/characteristic_pop.a.jsp

형태적 · 물리적 특성

토성

물빠짐정도

토양의색

기타

▶ 유거(runoff), 투수성(permeability), 지하수위(ground water table) 등의 종합적인 영향이 반영되어 나타남.

▶ 단면의 주된 토색 및 반문에 의한


· 구분

- 매우양호 : 물이 쉽게 빠지며 토색은 황갈색, 갈색, 경사가 급함
- 양호 : 물이 쉽게 빠지며 토색은 적갈색, 황적색, 황갈색, 갈색, 약간의 반문을 가지기도 함
- 약간양호 : 물의 이동이 다소 느리며 감시 습한 상태에 있다. 토색은 황갈색 내지 갈색이며 심토에 화색반문이 약간 있음
- 약간불량 : 물의 이동이 느리며 상당한 기간동안 습한 상태에 있다. 토색은 회색 또는 회갈색, 철수 반문(황갈색, 적갈색) 가짐
- 불량 : 장기간 습한 상태로 있으며 지하수위가 높다. 토색은 회색 및 청회색, 매우불량보다 반문이 많음
- 매우불량 : 장기간 습한 상태로 있으며 지하수위가 높다. 토색은 회색 및 청회색

- 토성




- 토지이용추천




토양환경지도 - 토양 GIS 주제도

- 논 적성등급




토양환경지도 - 토양 GIS 주제도

- 농경지 화학성: 토양 pH, 유효규산 등




농경지화학성-논 pH(2009)



농경지화학성-논 유효규산(2010)

토양환경지도 - 작물별 토양적성도


- 토양특성, 작물생산성을 고려한 작물별 토양적지 기준을 설정하여 적지적작에 활용할 수 있도록 지도형태로 제공



년도	개수	대 상 작 물
~'06년	19	옥수수, 감귤, 단감, 유자, 참다래, 매실, 배, 복숭아, 사과, 포도, 콩, 논콩, 참깨, 양파, 감자, 고추, 당근, 무, 배추
'07년	10	수수, 조, 양배추, 고구마, 들깨, 메론, 오이, 수박, 구기자, 호박
'08년	10	토마토, 딸기, 참외, 마늘, 상추, 메밀, 오미자, 숙갓, 유채, 곰취
'09년	10	부추, 케일, 땅콩, 참취, 가지, 피망, 산수유, 곤달비, 우영, 생강
'10년	12	양상추, 시금치, 신선초, 셀러리, 강할, 당귀, 천궁, 황기, 사삼, 도라지, 마, 인삼(원예원)
'13~'15	3	맥문동, 복분자, 팔
계	64	

토양환경지도 - 작물별 토양적성도

- 마늘(태안)



작물별 토양적성도 - 마늘

토양환경 공간정보 (휴토람)

농업인·지도자: 작물별 시비처방, 농작물 재배적지, 필지별 토양특성

정책입안자: 통계자료, 친환경농업지구 토양정보, 국가주요기반시설 조성


유관기관: 환경·재해영향평가, 기후변화, 농업생태계, 토양관리, 수자원 관리

일반인: 우리나라 토양 이해, 토양생성, 토양의 중요성




동계작물 재배현황 및 배수등급 특성 분석


- Landsat-8 위성영상과 팜 맵을 활용한 연차별 동계작물 재배 현황도 제작
 - 동계작물 재배면적 10% 감소 : (13/14)30%→(14/15)20%
- 휴토람 정보와 연계하여 재배현황에 따른 필지별 배수등급 특성 검토
 - 배수 '약간불량'지에서 재배면적 10% 감소 : (13/14)26%→(14/15)16%




<동계작물 재배현황(13/14년)>



<동계작물 재배현황(14/15년)>



<동계작물 재배지 배수등급 분포(13/14년)>



<동계작물 재배지 배수등급 분포(14/15년)>

**동계작물 관련
재배면적 변동 원인 분석 및
추파/춘파 파종시기 설정
관련 정보 제공**

1 원격탐사 기반 작황분석 현황

2 농업분야 공간정보 구축 및 활용


3 작황분석 사례 : 충청남도 대상

4 토양환경 공간정보(휴토람)

5 금후계획

금후계획

정책적 활용 방안



금후계획

국가 농업정책 및 영농현장 지원

농업항공·위성정보활용센터



정확도 향상



활용성 향상



국가 단위(국외)

- ❖ 곡물 생산국 재배면적, 수량 정보
- ❖ 증발산량, 기름 등 생산환경 정보
- ❖ 기후변화에 따른 생산성 변동 정보


지역 단위(국내)

- ❖ 지자체, 주산지별 작물재배면적 생육상황 및 수량 정보
- ❖ 농경지 정보(농업재해, 경작유무 등)


들녘 단위

- ❖ 들녘 단위 작물 생육 정보
- ❖ 작물 병해충, 기상 피해 정보
- ❖ 농경지 양분 관리 정보


농작물 생육 상황 파악




농작물 수량 추정




물관리-증발산량·토양수분



양분·병해충 관리



농업재해관리



경청해 주셔서 감사합니다.